2


选手3、2完成：腹腔穿刺术
题干1：男，65岁，因近1月感腹围逐渐增大，腹胀难忍，不能平卧就诊。查体：腹膨隆，腹肌紧张，无压痛、反跳痛，移动性浊音（+），肝肋下未及，脾右肋下约2cm，质韧，无压痛。
提示卡1：患者生命体征
提示卡2：腹部B超提示：腹部可探及大量液性暗区。
提示卡3：实验室检查正常
提示卡4：知情同意书已签署
操作完成，给出答题卡
答题卡：患者抽出血性腹水如何处理?
选手1完成：导尿术
题干2：男，65岁，因近1月感腹围逐渐增大，腹胀难忍，不能平卧就诊。查体：腹膨隆，腹肌紧张，无压痛、反跳痛，移动性浊音（+），肝肋下未及，脾右肋下约2cm，质韧，无压痛。患者膀胱充盈，无法自主排尿
提示卡1：患者生命体征
提示卡2：膀胱明显隆起，叩诊呈浊音


患者，马莉，女，35岁，产后月余，哺乳期。因“自汗怕风2月，加重1周”入我院中医科门诊。患者自产后出现自汗，竟淋漓不止，动则加重，易倦怠乏力，周身酸楚，稍不慎即感冒。来诊时：频频作拭，颇感苦恼，面白少华，微胖，肌肉松弛，疲惫貌。舌淡苔薄白而润，脉浮缓无力。（SP）
选手1完成：
选手2完成：
选手3完成：

3

操作：脊柱损伤搬运处理
操作：消毒铺单
操作：肠吻合
站点1题干：患者男，37岁，车祸伤，呼之不
站点2题干：仍是该患者，需要进行小肠修补
站点3题干：仍是该患者，患者已完成消毒铺


题干：患者男性，因“车祸伤 血气胸”送入急诊科，后因进行性血气胸行“开胸探查术”，术后一般情况良好。今日术后第3天，患者出现右下肢肿胀，周径增粗，医生查体过程中突然出现神志丧失。